

نیترات کلسیم



دستور العمل مصرف:

- مصرف خاکی غرقابی: ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار
- مصرف خاکی توسط سیستم آبیاری ۶ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار
- مصرف محلولپاشی: ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار

تجزیه ضمانت شده (برحسب درصد وزنی):

مقدار	عنصر
٪۱۵/۵	حداقل نیتروژن کل
٪۱۴/۴	حداقل میزان نیترات
٪۱/۱	حداکثر نیتروژن آمونیاکی
٪۱۹	حداقل مقدار کلسیم محلول در آب به صورت (Ca)



مونو پتاسیم فسفات



دستور العمل مصرف:

- مصرف خاکی غرقابی: ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار
- مصرف خاکی توسط سیستم آبیاری ۶ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار
- مصرف محلولپاشی: ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار

تجزیه ضمانت شده (برحسب درصد وزنی):

مقدار	عنصر
٪۵۲	حداقل فسفات محلول در آب بر مبنای (P ₂ O ₅)
٪۳۴	حداقل پتاسیم محلول در آب به صورت (K ₂ O)



مونو آمونیوم فسفات



دستور العمل مصرف:

- مصرف خاکی غرقابی: ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار
- مصرف خاکی توسط سیستم آبیاری ۶ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار
- مصرف محلولپاشی: ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار

تجزیه ضمانت شده (برحسب درصد وزنی):

مقدار	عنصر
٪۱۲	حداقل نیتروژن کل آمونیاکی
٪۶۱	حداقل فسفات محلول در آب بر مبنای (P ₂ O ₅)



سولفات پتاسیم



دستور العمل مصرف:

- مصرف خاکی غرقابی: ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار
- مصرف خاکی توسط سیستم آبیاری ۶ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار
- مصرف محلولپاشی: ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار

تجزیه ضمانت شده (برحسب درصد وزنی):

مقدار	عنصر
٪۵۰	پتاسیم محلول در آب
٪۱۸	گوگرد محلول (S)



بهین رویش سبزآرتا

محصولات وارداتی



residue
FREE

بدون
باقیمانده

بهین رویش سبزآرتا
www.sabzarta.com
info@sabzarta.com
@sabzarta
@naturland_iran

کرمان، خیابان شهید بهشتی
بهشتی ۸، برج اطلس، واحد ۲ تجاری
طبقه ۲، کدپستی: ۷۶۱۳۶۷۹۳۷۱
تلفن: ۰۳۴ - ۳۱۶۲۵۰۰۰
۰۳۴ - ۳۷۸۲
مدلی مشتری: ۰۳۴ - ۳۱۶۲۵۰۲۵



ان پی کا 20-20-20+TE



بارزترین تکنولوژی های روز دنیا در یک محصول به کار گرفته شده است.

- تولید به صورت Spray dryer در این روش شما در یک ذره تمامی عناصر را در کنار هم خواهید داشت.
- دارای ۳ فرم نیتروژن جهت حداکثر جذب ممکن و عدم آیشویی و تثبیت عنصر
- میکرو المنت های کلات شده با EDTA
- استفاده از تکنولوژی (WSG) جهت حداکثر سرعت و میزان حلالیت در تمامی شرایطها
- ایده آل جهت محلول پاشی (عاری از فلزات سنگین - کلر و سدیم صفر)
- استفاده از Anti-Caking Agents جهت جلوگیری از کلوخه و سفت شدن
- PH اسیدی حدود 4

دستور العمل مصرف:

- محلول پاشی: ۲ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب
- مصرف آبیاری ۷۵ الی ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار

تجزیه ضمانت شده (برحسب درصد وزنی):

عنصر	مقدار
نیتروژن کل	۲۰٪
فسفر قابل استفاده	۲۰٪
پتاسیم محلول در آب	۲۰٪
بر محلول در آب	۰/۰۲٪
منگنز کلاته به فرم EDTA	۰/۰۲٪
روی کلاته به فرم EDTA	۰/۰۵٪
مولیبدن محلول در آب	۰/۰۵٪



ان پی کا 12-12-36+TE



استفاده از تمامی روش های نوین جهت بالاترین جذب پتاسیم

- عدم استفاده از اوره جهت مقابله با آیشویی و جذب حداکثری
- ایده آل جهت محلول پاشی (عاری از فلزات سنگین - کلر و سدیم صفر)
- میکرو المنت های کلات شده با EDTA
- تولید شده به صورت Spray dryer در این روش در یک ذره تمامی عناصر را در کنار هم خواهید داشت.
- استفاده از تکنولوژی (WSG) جهت حداکثر سرعت و میزان حلالیت در تمامی شرایطها
- استفاده از Anti-Caking Agents جهت جلوگیری از کلوخه و سفت شدن
- PH اسیدی حدود 4

دستور العمل مصرف:

- محلول پاشی: ۲ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب
- مصرف آبیاری ۷۵ الی ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار

تجزیه ضمانت شده (برحسب درصد وزنی):

عنصر	مقدار
نیتروژن کل	۱۲٪
فسفر قابل استفاده	۱۲٪
پتاسیم محلول در آب	۳۶٪
بر محلول در آب	۰/۰۲٪
منگنز کلاته به فرم EDTA	۰/۰۲٪
روی کلاته به فرم EDTA	۰/۰۵٪
مولیبدن محلول در آب	۰/۰۵٪



ان پی کا 10-52-10+TE



تامین حداکثر فسفر به همراه سایر عناصر در یک محصول

- عدم استفاده از اوره جهت مقابله با آیشویی و جذب حداکثری
- میکرو المنت های کلات شده با EDTA
- ایده آل جهت محلول پاشی (عاری از فلزات سنگین - کلر و سدیم صفر)
- تولید شده به صورت Spray dryer در این روش در یک ذره تمامی عناصر را در کنار هم خواهید داشت.
- استفاده از تکنولوژی (WSG) جهت حداکثر سرعت و میزان حلالیت در تمامی شرایط ها.
- PH اسیدی حدود 4
- استفاده از Anti-Caking Agents جهت جلوگیری از کلوخه و سفت شدن

دستور العمل مصرف:

- محلول پاشی: ۲ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب
- مصرف آبیاری ۷۵ الی ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار

تجزیه ضمانت شده (برحسب درصد وزنی):

عنصر	مقدار
نیتروژن کل	۱۰٪
فسفر قابل استفاده	۵۲٪
پتاسیم محلول در آب	۱۰٪
بر محلول در آب	۰/۰۲٪
منگنز کلاته به فرم EDTA	۰/۰۲٪
روی کلاته به فرم EDTA	۰/۰۵٪
مولیبدن محلول در آب	۰/۰۵٪



الگامکس



آسکوفیلوم نودوسوم با منشأ آب های سرد اروپا

سرشار از هورمون های رشد (اکسین ، سیتوکنین ، جیبرلین)، ویتامین ها و عناصر غذایی، مقاومت گیاه را در برابر تنش های محیطی ، گرما ، سرما ، آفات و بیماری ها افزایش داده و رشد عملکرد گیاه را به طور چشمگیر تقویت می کند.

دستور العمل مصرف:

- محلول پاشی: ۵/۰ تا ۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب

تجزیه ضمانت شده (برحسب درصد وزنی):

عنصر	مقدار
آمینو اسید آزاد	۱/۲٪
نیتروژن کل	۱/۵٪
ماده آلی	۴۵٪
کلسیم کل	۱/۲٪
فسفر قابل استفاده	۴٪
پتاسیم محلول کل	۱۸٪
آلژینیک اسید	۱۸٪
مانیتول	۰/۵٪
بتائین	۰/۰۰۴۲ppm
گوگرد کل	۱/۵ ppm



فرو ۴۸



- پایداری بسیار بالا در خاک های آهکی و قلیایی (مناسب جهت شرایط خاکهای ایران)
- اورتو اورتو فراتر از 4.8
- به فرم میکروگرانوله و فرمولاسیون (WSG) با حداکثر حلالیت آهن در دنیا
- فاقد هر گونه فلزات سنگین - کلر و سدیم صفر

دستور العمل مصرف:

- آبیاری مرکبات: ۵۰ تا ۷۰ گرم
- آبیاری پسته: ۵۰ تا ۱۰۰ گرم
- آبیاری درختان میوه: ۴۰ تا ۸۰ گرم
- آبیاری کشتهای زراعی: ۲ تا ۵ کیلوگرم بر هکتار
- آبیاری محصولات گلخانه ای: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ متر مربع
- آبیاری نخیلات: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درخت
- محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب

عنصر	مقدار
آهن محلول	۶٪
آهن کلاته با EDDHA با ایزومراورتنو -اورتنو	۴/۸٪



آمینات مگنوم



- تهیه شده از با کیفیت ترین منابع آمینو اسید های گیاهی
- انتخاب بالاترین درصد آمینو اسید های آزاد قابل جذب
- فاقد هر گونه عناصر سنگین - کلر و سدیم صفر
- حلالیت فوق العاده و مناسب جهت محلول پاشی
- فرم میکرو گرانول

دستور العمل مصرف:

- مصرف آبیاری ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار
- محلول پاشی: ۵/۰ تا ۱ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب

عنصر	مقدار
نیتروژن کل	۱۳٪
آمینو اسید کل	۸۰٪
آمینو اسید آزاد	۷۰٪



هیوم سوپر



- تولید شده از خالص ترین و با کیفیت ترین منابع لئوناردیت اروپا
- بهبود حداکثری در خواص فیزیکی- شیمیایی و فعالیت میکروبیولوژی خاک
- افزایش تبادل کاتیونی خاک در محیط ریزوسفر
- بالاترین سرعت حلالیت ممکن در هیومیک اسیدها

دستور العمل مصرف:

- مصرف آبیاری ۲ تا ۳ کیلوگرم در هکتار
- محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب

عنصر	مقدار
پتاسیم محلول در آب	۱۰٪
مواد هیومیکی کل	۶۲٪
اسید هیومیک	۶۰٪
فولویک اسید	۲٪

